

Boletim SerTão Cidadãs

Controle de Verminoses em Caprinos e Ovinos



O que é?

A verminose é uma doença causada por parasitas que entram pela boca e se instalam no estômago e intestino do animal, causando sérios prejuízos à saúde.



Principais sintomas

- Anemia (*mucosa dos olhos esbranquiçada*);
- Emagrecimento;
- Diarreia moderada;
- Papada inchada;
- Morte.

Prevenção

- Limpar as instalações a cada 2 (dois) dias;
- Alimentar os animais fora do curral;
- Usar cochos apropriados;
- Soltar os animais mais tarde;
- Usar o pastejo rotacionado;
- Pastejo misto com outros animais.



A Solução

A verminose é um dos principais problemas sanitários dos rebanhos de caprinos e ovinos. É a doença que mais dá prejuízo aos agricultores(as), pois afeta de forma prática os animais, reduzindo o consumo voluntário de alimentos, afetando a digestão e a absorção de nutrientes, diminuindo a eficiência reprodutiva e, conseqüentemente, a produtividade geral do rebanho (leite e carne).



Além disso, aumenta as despesas financeiras geradas com o aumento da mão de obra, medicamentos e perdas com a mortalidade animal. É necessário um conjunto de medidas de controle, além de uma vermifugação seletiva e efetiva.

Por isso, amigo(a) agricultor(a), não se esqueça! A solução é prevenir e tratar seletivamente os animais, selecionando com cuidado e eliminando os mais sensíveis do rebanho.

Cartão Farmacha

Uma maneira simples e de baixo custo para identificar no rebanho os animais que necessitam de vermifugação é o Cartão Farmacha, que avalia a coloração mucosa ocular revelando o grau da anemia. Dessa forma, é possível realizar o tratamento sem recorrer a exames laboratoriais e reduzir em até 75% o uso de medicação.



Ótimo.
Não vermifugar!



Bom
Não vermifugar!



Aceitável.
Vermifugar!



Cuidado.
Vermifugar!



Risco de morte.
Vermifugar!

► Importante

Tratamento: Fazer a avaliação da mucosa do olho e vermifugar somente os animais anêmicos. *Essa avaliação é feita através do Cartão Farmacha com a ajuda do seu técnico ou veterinário.*



Três qualidades de um cocho apropriado

1. Devem ser afastados do chão;
2. Fundos para caber alimentos oferecidos (palma, silagem, feno, grãos...);
3. Ter a proteção para que o animal não suba e contamine com fezes.

Medidas de Controle Parasitário

As verminoses podem causar inúmeros prejuízos ao criador, dentre elas a elevada taxa de mortalidade e baixa produtividade dos rebanhos. Fêmeas em lactação e filhotes após o desmame são as categorias mais suscetíveis às parasitoses.

Dicas para controle de verminose:

- Efetuar a 1ª vermifugação logo após os 30 dias de vida. Repetir o tratamento entre 21 e 28 dias após;
- Realizar 2 vermifugações estratégicas de todo o rebanho no período seco (maio e agosto) e 3 no período chuvoso (novembro, janeiro e março);
- Realizar a substituição do princípio ativo do vermífugo no mínimo 1 vez por ano, evitando que os parasitas criem resistência;
- Realizar rotação de pastagem e lotação adequada de animais por área.
- Realizar limpeza das instalações com frequência;
- Utilizar local para armazenar esterco provenientes da limpeza das instalações distantes de animais;
- Utilizar cochos limpos e apropriados para os animais;
- Utilizar bebedouros adequados, higienizados frequentemente e com água limpa;
- Utilizar pastejo misto com outros animais.

